KOMPENDIUM EKG

dla Ratownika Medycznego

Ocena rytmu • Rytmy prawidłowe • Zaburzenia rytmu

Bloki AV • Rytmy zatrzymania krążenia



Ratownictwo Medyczne | Sem. 4

MedKrak Sp. z o.o. | 2026

Systematyczna ocena EKG — zawsze w tej samej kolejności!
Prędkość papieru: 25 mm/s | 1 mały kwadrat = 0,04 s | 1 duży kwadrat = 0,20 s | 1 mV = 10 mm

1 RYTM — miarowy czy niemiarowy?

- Oceń odstępy RR (szczyt R do szczytu R).
- Miarowy = wszystkie RR równe (różnica <10%).
- Niemiarowy = różne RR (np. FA, ekstrasystolie, blok Wenckebacha).
- Wskazówka: przyłóż linijkę lub skraj kartki do kolejnych R.

2 CZĘSTOŚĆ RYTMU — bradykardia / norma / tachykardia?

- Metoda 300: 300 ÷ liczba dużych kwadratów między R a R.
- Metoda 1500: 1500 ÷ liczba małych kwadratów między R a R.
- Norma: 60–100/min | Bradykardia: <60/min | Tachykardia: >100/min.
- Przy niemiarowym rytmie: policz kompleksy w 6 sekundach × 10.

3 FALE P — czy są? Regularne? Przed każdym QRS?

- P prawidłowe: wygładzone, dodatnie w II, ujemne w aVR.
- Brak P → migotanie przedsionków (FA) lub zastępczy rytm komorowy.
- P bez QRS → blok AV (II lub III stopnia).
- Wiele P na jeden QRS → trzepotanie przedsionków (AFL).

4 ODSTĘP PR — prawidłowy czy wydłużony?

- Prawidłowy PR: 0,12–0,20 s (3–5 małych kwadratów).
- PR > 0,20 s (>5 kw.) = blok AV I stopnia.
- PR zmienny (coraz dłuższy) = blok AV II Mobitz I (Wenckebach).
- PR stały ale QRS wypadają = blok AV II Mobitz II.


5 ZESPÓŁ QRS — wąski czy szeroki?

- Prawidłowy QRS: <0,12 s (<3 małe kwadraty) = nadkomorowy.
- QRS szeroki (>0,12 s) = komorowy lub blok odnogi (LBBB/RBBB).
- Brak QRS lub chaotyczny = VF, asystolia, artefakt.
- Sprawdź osi QRS: norma 0° do +90°.

6 ODCINEK ST i FALA T — uniesienie / obniżenie?

- ST uniesiony (>1 mm w 2 odprowadzeniach) → STEMI do wykluczenia.
- ST obniżony → niedokrwienie, NSTEMI, efekt naparstnicy.
- T ujemne → niedokrwienie, przerost, bloki.
- T ostro-spiczaste wysokie → hiperkaliemia.

Rytm Zatokowy Prawidłowy (NSR)




60–100/min | QRS wąski | P przed każdym QRS

NORMA MIAROWY

Prawidłowy rytm serca — 60–100/min.
Fale P: regularne, poprzedzają każdy QRS.

Tachykardia Zatokowa




>100/min | P przed QRS | QRS wąski

TACHYKARDIA >100/min

Częstość >100/min, zazwyczaj 100–160/min.
P przed każdym QRS — rytm zatokowy zachowany.

Bradykardia Zatokowa




<60/min | P przed QRS | QRS wąski

BRADYKARDIA <60/min

Częstość <60/min.
P prawidłowe przed każdym QRS. Miarowy.

Częstoskurcz Nadkomorowy (SVT)




150–250/min | QRS wąski | P ukryte

SVT NAGŁE

Częstość 150–250/min. QRS wąski (<0,12 s).
Fale P ukryte w QRS lub za nim.

Migotanie Przedsionków (FA / AF)




Niemiarowy | Brak P | Linia podstawy drżąca | QRS wąski

NIEMIAROWY BRAK FAL P UDAR!

Najczęstsza arytmia. Chaotyczna depolaryzacja przedsionków ~350–600/min.
EKG: brak wyraźnych fal P, drżąca linia izolektryczna (fale f).
QRS: wąskie (jeśli brak bloku odnogi), niemiarowe odstępy RR — klucz!
Przyczyny: nadciśnienie, wada mitralna, nadczynność tarczycy, alkohol, kardiomiopatia.

Trzepotanie Przedsionków (AFL / Atrial Flutter)




Regularny | Fale piłokształtne (F) ~300/min | Blok AV 2:1 / 4:1

MIAROWY FALE F = PIŁOKSZTAŁTNE 2:1 / 4:1

Szybka, regularna depolaryzacja przedsionków ~300/min (makroreentry).
EKG: fale F = piłokształtne (najlepiej widoczne w II, III, aVF).
Częstość komór: zależy od bloku AV — najczęściej 2:1 (150/min) lub 4:1 (75/min).
RR regularne (jeśli blok stały). Brak izolinii między falami F.

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA (NZK) — 4 rytmy:
Do defibrylacji: VF, VT bez tętna | NIEdefibrylowalne: Asystolia, PEA

Migotanie Komór (VF)




CHAOTYCZNY | Brak QRS | DEFIB!

DEFIB! NZK

Chaotyczna, nieuporządkowana aktywność elektryczna komór.
EKG: brak QRS, fale nieregularne o zmiennej amplitudzie.
Mechanicznie: BRAK skurczu → NZK natychmiast!

Częstoskurcz Komorowy (VT) bez tętna




MIAROWY | QRS SZEROKI >0,12s | DEFIB!

DEFIB! QRS SZEROKI

Szybki rytm komorowy >100/min, QRS szerokie (>0,12 s).
Monomorphic VT: jednakowe, regularne QRS.
Jeśli BEZ tętna → jak VF → RKO + defibrylacja!

Asystolia




LINIA PROSTA | Brak aktywności el.

NIE DEFIB! NZK

Brak elektrycznej aktywności serca. Linia prosta (lub minimal noise).
ZAWSZE sprawdź: odprowadzenia, elektrody, kontakt z pacjentem!
Upewnij się w 2 odprowadzeniach — wyklucz błąd techniczny.

PEA — Czynność Elektryczna Bez Tętna



ZORGANIZOWANY rytm EKG | BRAK tętna | NIE DEFIB

NIE DEFIB! 4H + 4T!

EKG: może wyglądać normalnie lub prawie normalnie.
Pacjent: BRAK tętna centralnego pomimo aktywności el.
Diagnoza: aktywność EKG + brak tętna = PEA.

Blok AV I stopnia




PR >0,20 s (>5 kw.) | Każde P przewiedzione | MIAROWY

PR WYDŁUŻONY | ŁAGODNY

Każda fala P jest przewiedzione do komór — żaden QRS nie wypada.
PR stale >0,20 s (>5 małych kwadratów) — to jedyny objaw.

Blok AV II stopnia — Mobitz I (Wenckebach)




PR coraz dłuższy → wypadnięcie QRS → reset

PR ROŚNIE | WYPADNIĘCIE QRS

PR progresywnie się wydłuża aż do wypadnięcia QRS — potem reset.
Po wypadniętym QRS: PR wraca do wartości wyjściowej.

Blok AV II stopnia — Mobitz II




PR STAŁY → nagłe wypadnięcie QRS (bez ostrzeżenia)

PR STAŁY | NAGŁE QRS! | NIEBEZPIECZNY

PR stały (nie wydłuża się), ale nagle QRS wypada bez ostrzeżenia.
QRS często SZEROKI (zaburzenie poniżej węzła AV — w pęczku Hisa)

Blok AV III stopnia — Całkowity




P i QRS NIEZALEŻNE | Dysocjacja AV | SZEROKI QRS

DYSOCJACJA AV | PILNE! | QRS SZEROKI

Brak przewodzenia z przedsionków do komór — całkowita dysocjacja.
P: swoja częstość (70–80/min). QRS: rytm zastępczy (30–40/min).

Blok Lewej Odnogi Pęczka Hisa (LBBB)



QRS >0,12s | Wzorzec M w V5/V6 | Blok w lewej odnodze

QRS SZEROKI **STEMI RÓWNOWAŻNIK!**

QRS ≥0,12 s (≥3 małe kwadraty) — wymagany do rozpoznania.
Wzorzec M (notched R) w V5, V6, aVL — odprowadzenia boczne.

Tabela podsumowująca — szybka identyfikacja rytmu

Rytm	Fale P	PR	QRS	RR	Częstość	Priorytet
NSR	Prawidłowe	0,12-0,20	Wąski <0,12	Miarowy	60-100	Monitoruj
Tachykardia zatokowa	Prawidłowe	N	Wąski	Miarowy	>100	Lecz przyczynę
Bradykardia zatokowa	Prawidłowe	N	Wąski	Miarowy	<60	Atropina jeśli obj.
SVT	Ukryte/za QRS	N/A	Wąski	Miarowy	150-250	Adenozyna/KW
FA (AF)	Brak (fale f)	Brak	Wąski*	NIEMIARowy	60-170	Monitoruj/KW
AFL	Fale F piłok.	Brak	Wąski*	Miarowy	75-150	Kardiowersja
VT z tętnem	Dysocjacja	N/A	SZEROKI	Miarowy	>100	KW/Amiodaron
VF	Brak	Brak	Brak QRS	Chaos	Chaos	DEFIB natychmiast
Asystolia	Brak	Brak	Brak	Brak	0	RKO + Adrenalina
PEA	Może być	Może być	Zorg.	Różny	Różna	RKO + 4H/4T
Blok AV I	Prawidłowe	>0,20s	Wąski	Miarowy	N	Obserwacja
Blok AV II Mob.I	Prawidłowe	Rośnie	Wąski	Niemi.	N/obniż.	Atropina/PM
Blok AV II Mob.II	Prawidłowe	Stały	SZEROKI	Niemi.	Obniżona	TCP → PM
Blok AV III	Dysocjacja	Brak zw.	SZEROKI	Miarowy	30-40	TCP → PM
LBBB	Prawidłowe	N	SZEROKI M	Miarowy	N	Wyklucz STEMI

** Jeśli towarzyszący blok odnogi → QRS szeroki | N = prawidłowy | KW = kardiowersja elektryczna | PM = stymulator | TCP = pacing przezskórny*

Topografia zawału — która ściana, które odprowadzenia

STEMI = uniesienie ST ≥1 mm w ≥2 sąsiednich odprowadzeniach (≥2 mm w V1–V3)
Zawsze szukaj zmian lustrzanych (reciprocal) — potwierdzają STEMI i wskazują ścianę!

Ściana	Uniesienie ST	Obniżenie (lustro)	Tętnica	Uwagi kliniczne
ŚCIANA DOLNA II, III, aVF	**I, aVL**		RCA (90%) / LCx (10%)	Bradykardia, blok AV, hipotonia. Ryzyko zawału RV! UWAGA: unikaj azotanów przy podejrzeniu RV.
ŚCIANA PRZEDNIA V1–V4	**II, III, aVF**		LAD	Największy obszar ryzyka → wstrząs kardiogenny. Blok LBBB, VT/VF, dysfunkcja LV. Tombstone ST.
ŚCIANA BOCZNA I, aVL, V5–V6	**V1–V3 (niekiedy)**		LCx	Często towarzyszący do dolnego/przedniego. Izolowany rzadki. Mniejszy obszar martwicy.
ŚCIANA PRZEGRODOWA V1–V2	**Brak typowych**		LAD (sept.)	QS w V1–V2. Ryzyko perforacji przegrody. Może towarzyszyć blokowi LBBB.
ŚCIANA TYLNA V7–V9 (uniesienie!)	**V1–V3 wysoka R**	**↓ obniżenie ST**	RCA lub LCx	TRUDNY — brak uniesień w 12 standardowych. V1–V3: wysokie R + poziome obniżenie ST = lustro. Dodaj V7–V9: uniesienie ≥0,5 mm = STEMI tylny.
PRAWA KOMORA (RV) V1, V3R–V4R	**Brak typowych**		RCA (proksymalna)	Towarzyszy zawałowi dolnemu! Triada: hipotonia + żylne przepełnienie + czyste płuca. BEZWZGLĘDNIE unikaj azotanów i diuretyków!

RCA = prawa t. wieńcowa | LAD = lewa t. zstępująca przednia | LCx = gałąź okalająca | Czerwony = zmiany lustrzane

Schemat: bloki anatomiczne EKG



Ewolucja zmian EKG w zawale serca (STEMI)

FAZA 0 — Minuty
Hiperakutalne T (wysokie, szerokie)
Pierwsze minuty — łatwo przeoczyć
Wysoki, szeroki, symetryczny T.
Jeszcze bez uniesienia ST.

FAZA 1 — 1–6h
Uniesienie ST (fala Pardeego)
Uniesienie ST tombstone/convex.
Brak Q — martwica jeszcze nie
Zmiany lustrzane w przeciwnych

FAZA 2 — 6–24h
ST + Q patologiczny
Pojawia się Q patologiczny (>0,04
ST nadal uniesiony. T się odwraca
Martwica pełnościenna.


FAZA 3 — Dni–tygodnie
ST normalizuje Odwrócone T
ST wraca do izolinii.
T odwrócone (ujemne).
Q patologiczny pozostaje.

FAZA 4 — Miesiące
Blizna: Q patologiczny
Stały Q patologiczny = blizna.
ST i T mogą się normalizować.
Brak Q = zawał podwsierdziowy.

Wzorce EKG w zawale — paski z opisem (1/2)

1. HIPERAKUTALNE T — Faza 0 zawału (pierwsze minuty)


Odprowadzenia: II, III, aVF (zawał dolny) | lub V1–V4 (zawał przedni)



Co widzisz: wysokie, szerokie, symetryczne fale T — wyraźnie wyższe niż w
Fala T jest spłaszczona u szczytu i szeroka u podstawy — nie ostro spiczasta
Odcinek ST jeszcze nie uniesiony lub minimalnie — to faza PRZED klasyczny
Brak fali Q — martwica jeszcze nie nastąpiła, okno ratowania jest otwarte!
PUŁAPKA: łatwo przeoczyć jeśli nie porównujesz z poprzednim EKG pacjenta

2. STEMI ŚCIANA DOLNA — uniesienie ST w II, III, aVF


Uniesienie ST: II, III, aVF | Zmiany lustrzane: I, aVL | Dodaj: V3R–V4R (RV)



Co widzisz: wypukłe ku górze (convex) uniesienie ST ≥1 mm w II, III i aVF.
Uniesienie najwyższe zwykle w III. Fala T może być wysoka, płaska lub odwr
ZAWSZE szukaj zmian lustrzanych: obniżenie ST w I i aVL potwierdza rozpoz
Przyczyna: zamknięcie RCA (prawa tętnica wieńcowa) w ~90% przypadków
Ryzyko: bradykardia zatokowa, bloki AV (pobudzenie n. błędnego przez RCA

3. STEMI ŚCIANA PRZEDNIA — tombstone ST w V1–V4

Uniesienie ST: V1–V4 | Rozległy przedni: V1–V6, I, aVL | Lustro: II, III, aVF




Co widzisz: uniesienie ST o kształcie 'nagrobka' (tombstone) — trapezu lub
QRS wchodzi wprost w wysoko uniesiony ST — brak wyraźnego powrotu do
Im więcej odprowadzeń objętych zmianami i im wyższe uniesienie, tym gors
Szukaj zmian lustrzanych: obniżenie ST w II, III, aVF.
Przyczyna: zamknięcie LAD — lewa tętnica zstępująca przednia.

Wzorce EKG w zawale — paski z opisem (2/2)

4. ZMIANY LUSTRZANE (reciprocal changes) — obniżenie ST


Odprowadzenia: I, aVL (lustro zawału dolnego) | V1–V3 (lustro zawału tylnego)



Co widzisz: poziome lub skośne w dół obniżenie odcinka ST ≥0,5 mm.
Fala T może być dodatnia i wysoka — odwrotność ujemnego T po stronie za
To nie jest samodzielna diagnoza — zawsze towarzyszy uniesieniu ST gdzie
Obniżenie ST w I i aVL + uniesienie w II, III, aVF = zawał dolny (RCA).
Obniżenie poziome w V1–V3 bez uniesień = podejrzenie zawału tylnego → V

5. ZAWAŁ TYLNY — obraz lustrzany w V1–V3, potwierdzenie V7–V9

V1–V3: wysoka R + obniżenie ST (lustro) | Potwierdź uniesieniem w: V7, V8, V9



Co widzisz: wysoka fala R w V1–V2 (odpowiednik Q patologicznego widziane
Poziome obniżenie ST w V1–V3 ≥0,5 mm — wyraźne, trwałe.
Wysokie symetryczne T (odpowiednik ujemnego T od strony zawału).
W standardowych 12 odprowadzeniach BRAK uniesień ST — to pułapka diag
Wykonaj V7 (linia środkowa łopatki), V8 (linia przykręgosłupowa), V9 (przyk

6. BLIZNA ZAWAŁOWA — Q patologiczny + ujemne T

Odprowadzenia z Q: zależnie od lokalizacji przebytego zawału




Co widzisz: głęboki Q patologiczny na początku QRS, po którym małe R.
Kryterium Q patologicznego: szerokość >0,04 s (>1 mały kwadrat) LUB głęb
Odwrócone T (ujemne) — ślad po przebytym niedokrwieniu lub aktywne nie
Q dolny (II, III, aVF) = przebyty zawał dolny. Q w V1–V4 = przebyty zawał pr
Q patologiczny może pojawić się już po 2–3h od okluzji i trwa latami.

Wzorzec NSTEMI — obniżenie ST bez uniesienia

7. NSTEMI — obniżenie ST + ujemne T (brak uniesienia!)

Odprowadzenia: V4–V6, I, aVL lub II, III, aVF — zależnie od tętnicy | EKG może być PRAWIDŁOWE



Co widzisz: poziome lub skośne w dół obniżenie ST ≥0,5 mm bez uniesień.
Fala T ujemna, symetryczna — szczególnie w V4–V6 lub II, III, aVF.
KLUCZOWE: EKG może być ZUPEŁNIE PRAWIDŁOWE przy NSTEMI — nie wyk
Rozpoznanie potwierdza: podwyższenie troponin (Tn I lub TnT) w 2 pomiara
Pilność: koronarografia w ciągu 24–72h. Przy niestabilności → jak STEMI.

NSTEMI — zawał bez uniesienia ST

- EKG: obniżenie ST ≥0,5 mm i/lub ujemne T w ≥2 sąsiednich odprowadzeniach. Może być PRAWIDŁOWE!
- Troponiny: podwyższone — klucz diagnostyczny (EKG może nie wykazywać zmian).
- Różnica od UA: w NSTEMI troponiny są podwyższone, w niestabilnej dusznicy — PRAWIDŁOWE.
- Postępowanie: ASA 300 mg p.o. + heparyna + O2 jeśli SpO2 <94% + nitraty + morfina przy bólu.
- Pilność: koronarografia 24–72h. Przy niestabilności hemodynamicznej → tryb pilny jak STEMI.
- PAMIĘTAJ: ujemne EKG NIE wyklucza NSTEMI — zawsze oznacz troponiny!

Różnicowanie: STEMI vs NSTEMI vs UA

Cecha	STEMI	NSTEMI	Niestabilna dusznica (UA)
Uniesienie ST	**TAK (≥1mm, ≥2 odprow.)**	NIE	NIE
Obniżenie ST / ujemne T	**Zmiany lustrzane**	TAK (typowe)	Może być
Troponiny	**Podwyższone**	Podwyższone	PRAWIDŁOWE
EKG może być normalne?	**NIE**	TAK!	TAK
Pilność PCI	**Natychmiast (<90-120 min)**	24–72h (lub pilnie)	Wg ryzyka
Martwica mięśnia?	**TAK (pełnościenna)**	TAK (subendokard.)	NIE

Algorytm postępowania ratownika przy bólu w klatce

1. BEZPIECZEŃSTWO + OCENA WSTĘPNA
xABCDE. ACVPU. SpO2, tętno, RR, EKG w ciągu 10 min od kontaktu!

2. EKG 12-ODPROWADZENIOWE
Oceń ST w każdym odprowadzeniu. Dodaj V3R–V4R (RV) i V7–V9 (tylna) jeśli wskazanie.

3. DOSTĘP iv + ASA
ASA 300 mg p.o. (jeśli brak przeciwwskazań) + dostęp iv x2. Pobierz krew (troponiny, morfologia, koagulacja).

4. TLEN + NITRATY
O2 jeśli SpO2 <94%. NTG spray/p.o. jeśli RR >100 i brak bradykardii. UNIKAJ przy zawale RV i RR <100!

5. MORFINA (ostrożnie)
2–4 mg iv przy silnym bólu opornym na nitraty. Uwaga: może maskować objawy i zwalniać wchłanianie leków p.o.

6. MONITOROWANIE CIĄGŁE
EKG, SpO2, RR co 5 min. Defibrylator gotowy! Gotowość na VT/VF i NZK.

7. KONTAKT Z CENTRUM PCI
Przy STEMI: aktywacja pracowni hemodynamiki ZANIM dotrzesz! Door-to-balloon <90 min (optimum).

8. TRANSPORT
Pozycja półsiedząca. Spokojnie. Ciągłe monitorowanie. Poinformuj szpital o przyjeździe i obrazie EKG.

Farmakoterapia w zawale serca — leki ratownika

Schemat MONA — podstawa postępowania w zawale (i ACS)

M — Morfina | O — Oxygen (tlen) | N — Nitrogliceryna | A — Aspirin (ASA)

Uwaga: kolejność stosowania to O → A → N → M (tlen i ASA zawsze pierwsze!)

KWAS ACETYLOSALICYLOWY (ASA)

antyagregant / inhibitor COX

Dawka: **300 mg jednorazowo (dawka nasycająca)**

Droga: p.o. — tabletka do rozgryzienia / połknięcia

Wskazanie:

- Każdy pacjent z podejrzeniem ACS/zawału
- STEMI, NSTEMI, niestabilna dusznica
- Podaj natychmiast po rozpoznaniu

Przeciwwskazania:

- × Czynne krwawienie z przewodu pokarmowego
- × Ciężka alergia na salicylany
- × Trombocytopenia (<50 tys.)

Po dawce nasycającej → 75–100 mg/dobę przewlekle

Nie czekaj na wyniki badań — podaj klinicznie!

NITROGLICERYNA (NTG)

azotan / wazodylatator

Dawka: **0,4–0,8 mg p.o./spray | lub 1–3 mg/h iv (wlew)**

Droga: spray podjęzykowy / tabletka SL / wlew iv

Wskazanie:

- Ból wieńcowy — ulga objawowa
- Obrzęk płuc z uniesionym RR
- Nadciśnienie tętnicze w przebiegu ACS

Przeciwwskazania:

- × RR skurczowe < 90 mmHg (hipotonia!)
- × Zawał prawej komory (RV) — BEZWZGLĘDNIE!
- × Bradykardia < 50/min
- × Inhibitory PDE-5 w ciągu 24–48h (sildenafil)

Przy zawale RV → NTG może wywołać wstrząs!

Powtarzaj co 5 min jeśli RR >90 i ból utrzymuje się

Wlew iv: 10–200 mcg/min — titracja wg RR

MORFINA

opioid / analgetyk

Dawka: **2–4 mg iv powoli (można powtórzyć co 5–10 min**

Droga: iv — powoli przez 2–3 minuty | max ~10 mg

Wskazanie:

- Silny ból wieńcowy oporny na nitraty
- Obrzęk płuc (zmniejsza obciążenie wstępne)
- Silny lęk, pobudzenie

Przeciwwskazania:

- × Hipotonia (RR <90 mmHg)
- × Depresja oddechowa (SpO2 <94% bez O2)
- × Ostrożnie: POChP, astma, wiek podeszły

Uwaga: morfina może MASKOWAĆ objawy NSTEMI!

Zwalnia wchłanianie doustnych leków p-płytkowych

Odtrutka: nalokson 0,4 mg iv jeśli depresja odd.

TLEN (O2)

suplementacja O2

Dawka: **2–4 L/min przez wąsy | lub 10–15 L/min przez maskę**

Droga: inhalacja — wąsy tlenowe lub maska z rezerwuarem

Wskazanie:

- SpO2 < 94% — suplementacja obowiązkowa
- Duszność, obrzęk płuc, hipoksemia
- NZK — 100% O2 przez BVM

Przeciwwskazania:

- × SpO2 ≥ 94% — tlen NIE jest wskazany rutynowo!
- × Hiperoksja szkodzi — nasila uszkodzenie niedokrwienne

Cel: SpO2 94–98% (nie więcej!)

Dawne wytyczne: tlen dla każdego — to już nieaktualne

Monitoruj pulsoksymetrem — titruj przepływ

HEPARYNA NIEFRAKCJONOWANA (UFH)

antykoagulant

Dawka: **60–70 j.m./kg iv bolus (max 5000 j.m.) + wlew**

Droga: iv bolus + wlew ciągły | lub sc (LMWH alternatywnie)

Wskazanie:

- STEMI przed PCI — antykoagulacja
- NSTEMI / UA — leczenie przeciwzakrzepowe
- Zapobieganie dalszej progresji skrzepliny

Przeciwwskazania:

- × Czynne krwawienie wewnętrzne
- × Małopłytkowość poheparynowa (HIT) w wywiadzie
- × Ostrożnie: po niedawnej operacji

W ratownictwie: bolus 5000 j.m. iv + przekaż do szpitala

LMWH (enoksaparyna): 1 mg/kg sc — wygodniejsza

KLOPIDOGREL / TIKAGRELOL

antyagregant / inh. P2Y12

Dawka: **Klopidogrel: 300–600 mg p.o. | Tikagrelol: 180 mg**

Droga: p.o. — tabletka do połknięcia (dawka nasycająca)

Wskazanie:

- STEMI i NSTEMI — podwójna antyagregacja z ASA
- Tikagrelol preferowany (szybszy, silniejszy efekt)
- Podaj w izbie przyjęć lub przed PCI

Przeciwwskazania:

- × Czynne krwawienie
- × Tikagrelol: ciężka niewydolność wątroby, udar krwotoczny
- × Klopidogrel: ostrożnie przy CYP2C19 inhibitorach

Ratownik podaje ASA — klopidogrel/tikagrelol zwykle SOR

Podwójna antyagregacja (DAPT) = ASA + P2Y12 inhibitor

Kolejność podawania leków w praktyce ratownika:

1. Tlen (jeśli SpO2 <94%) → 2. ASA 300 mg p.o. → 3. Dostęp iv → 4. NTG (jeśli RR >90) → 5. Morfina (jeśli ból oporny) → 6. Heparyn

Różnice w farmakoterapii: STEMI vs NSTEMI

Lek	STEMI	NSTEMI / UA
ASA 300 mg	TAK — natychmiast, zawsze	TAK — natychmiast, zawsze
Tlen O2	Jeśli SpO2 <94% — cel 94–98%	Jeśli SpO2 <94% — cel 94–98%
Nitrogliceryna	TAK — jeśli RR >90 i brak RV BEZWZGL. UNIKAJ przy zawale RV!	TAK — ból wieńcowy, RR >90 Ostrożnie przy hipotonii
Morfina	TAK — przy silnym bólu opornym na nitraty	OSTROŻNIE — może maskować objawy zwalnia wchłanianie DAPT p.o.
Heparyna iv	TAK przed i w trakcie PCI (bolus 60–70 j.m./kg)	TAK — UFH lub LMWH (enoksaparyna 1 mg/kg sc)
Klopidogrel/Tikagrelol	TAK — dawka nasycająca (podwójna antyagregacja DAPT)	TAK — jak najszybciej Tikagrelol preferowany
Beta-blokery (metoprolol)	iv jeśli tachykardia i brak p/wsk. UNIKAJ przy bloku AV, hipot.	p.o. jeśli stabilny Redukuje ryzyko VT/VF
Amiodaron	VT/VF oporny na defibrylację 300 mg iv po 3. defibrylacji	Przy VT z tętnem 150 mg iv powoli


ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY (RV) — PUŁAPKA LEKOWA

Towarzyszy zawałowi dolnemu (RCA). Rozpoznaj i zmień postępowanie!

- Triada kliniczna: HIPOTONIA + wypełnione żyły szyjne + CZYSTE PŁUCA (bez obrzęku!)
- EKG: uniesienie ST w V3R–V4R ≥1 mm — wykonaj dodatkowe odprowadzenia prawokomorowe!
- BEZWZGLĘDNIE UNIKAJ: nitrogliceryny, diuretyków, morfiny bez ostrożności → ciężka hipotonia!
- LECZENIE: płyny iv agresywnie (NaCl 0,9% 250–500 ml bolus) → RV potrzebuje obciążenia wstępnego!
- Jeśli bradykardia / blok AV → atropina 0,5 mg iv. Przy braku efektu → TCP (pacing przezskórny).

Szybka ściąga — leki w kieszeni ratownika

ASA 300 mg p.o. → zawsze przy ACS — rozgryźć i połknąć
NTG 0,4 mg spray SL → ból wieńcowy, RR>90, brak RV — co 5 min
Morfina 2–4 mg iv → ból oporny na NTG, powoli — uważaj na oddech
O2 2–4 L/min wąsy → tylko jeśli SpO2 <94% — titruj do 94–98%
Heparyna 5000 j.m. iv → bolus przed PCI (wg zlecenia lekarza/protokołu)



Znaczenie kliniczne elementów krzywej EKG

Element	Znaczenie fizjologiczne	Norma	Odchylenia kliniczne
Fala P	Depolaryzacja przedsionków. Pochodzi z węzła SA.	Niska, wygładzona, dodatnia w II, aVF	Brak P: FA, rytm komorowy. Ujemne P w II: rytm z połączeni…
Odstęp PR	Czas od depolaryzacji przedsionków do depolaryzacji komór	0,12–0,20 s (3–5 małych kwadratów)	Wydłużony PR (>0,20s) = blok AV I°. Skrócony (<0,12s) = pr…
Fala Q	Pierwsza ujemna wychylenie QRS. Mała Q = przegroda.	Szer. <0,04 s i głęb. <25% fali R	Patologiczny (szer. >0,04s lub głęb. >25%R) = martwica …
Fala R	Główne dodatnie wychylenie — depolaryzacja ścian boczn…	Rosnąca R od V1 do V5.	Utrata R = brak…